





## KOKCIDIOZA PRI TELETIH

Ko se pojavi driska zaradi kokcidijev, je večji del škode že narejen. Obolela teleta okužujejo okolje, slabo priraščajo in so dovezetnejša za druge okužbe. Nekatere živali nosijo zajedavce v sebi, ne da bi kazale znake bolezni. Razvojne oblike kokcij (oociste) so v zunanjem okolju zelo odporne in zaradi tega je bolezen zelo težko izkoreniniti.

Bolezen povzročajo znotrajcelični zajedavci mikroskopske velikosti - protozoi (kokcidiji) - katerih razvojne oblike napadajo in uničujejo celice črevesnih resic. Pri razmnoževanju kokcij nastajajo boleče poškodbe črevesja, obsežne krvavitve črevesne sluznice, posledično pa **hude prebavne motnje** in slaba konverzija krme. Invadirana teleta izločajo z iztrebki na tisoče zelo odpornih oocist, ki v zunanjem okolju po 2 do 3 dneh sporulirajo in čakajo na novega (ali istega) gostitelja. Teleta se invadirajo, ko zaužijejo **sporulirane oociste** iz kontaminiranega okolja (s hrano, vodo, lizanjem).



**Vodena driska s primesjo krvi, napenjanje, grbasta drža, neješčnost, hujsanje z napredujočo slabokrvnostjo in zmanjšana proizvodnost so poglavitna zunanja znamenja bolezni.** Prisotnost kokcijev lahko potrdimo s koprološko parazitološko preiskavo iztrebkov živali šele 3 tedne po invaziji. V rejah, kjer je bila bolezen potrjena, priporočamo **preventivno zdravljenje** vseh novorojenih telet (pri starosti 10 do 14 dni) in vseh novonabavljenih telet. Preventivno zdravljenje je nujno **dopolnjevati s postopki hlevske higiene**, s katerimi uničujemo oociste v zunanjem okolju.

**Baycox® Bovis** je antiparazitik, ki preprečuje rast in razmnoževanje kokcij. Že pripravljeno delovno raztopino apliciramo v dozi **15 ml na 50 kg** telesne mase s pomočjo posebnega odmernika (drenča) direktno za koren jezika. Zadostuje enkratno dajanje.



Z enim originalnim pakiranjem (100 ml) lahko tretiramo 5 (pet) 65-kilogramskih telet. Zdravila ne smemo dajati živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. **Meso in organi zdravljenih telet niso primerni za prehrano ljudi v času dajanja zdravila in še 63 dni zatem.** Zdravilo se izdaja na veterinarski recept, zato morata biti izdaja in njegova poraba evidentirana v Dnevniku veterinarskih posegov. Pred uporabo preberite priloženo navodilo. Cena originalnega pakiranja znaša 43,60 €.