



Bolezen modrikastega jezika vse bližje

V začetku novembra so v gornji Avstriji odkrili prvo govedo okuženo z boleznijo modrikastega jezika. O sami bolezni smo nekaj več napisali v četrti številki Kmetovalca.

Povzročitelj bolezni je virus. Zaenkrat poznamo 24 serotipov (različic) virusa, ki jih prenašajo nekatere mušice. Medtem ko je večina serotipov razširjena v Sredozemlju, pa se je serotip 6 pomaknil proti severu in zdaj okužuje že velik del Evrope. Širi se z neverjetno hitrostjo, saj so od prvih pojavov bolezni v severozahodni Evropi minila komaj tri leta. Od poletja se je močno približal Sloveniji, saj so prvo okuženo žival odkrili v Avstriji. Ker je virus prisoten tudi na Madžarskem in v Italiji, je Slovenija praktično obkrožena in le vprašanje časa je, kdaj se bo bolezen pojavila tudi pri nas.



Znaki okužbe

Okužba z virusom bolezni modrikastega jezika se lahko kaže na različne načine. Znaki so lahko podobni kot pri drugih boleznih, zato lahko okužbo spregledamo. Prvi znak je običajno visoka vročina, ki jo spremljajo otekanje in bolečine gobca ter povečano slinjenje. V sluznici ust se pojavijo razjede. Sluznica pordeči ali postane vijolične barve, jezik pa modrikast – po njem je bolezen dobila tudi ime. Živali izgubljajo težo, šepajo, pri molznicah se zniža mlečnost ..., smrtnost lahko preseže 25 %.

Na bolezen so najbolj občutljive ovce. Za ljudi ni nevarna.

Zatiranje

Učinkoviti so predvsem preventivni ukrepi, in sicer cepljenje živali ali pa zatiranje prenašalcev (mušic). Za cepljenje so danes na voljo cepiva za vse serotipe. Cepljenje pa mora biti opravljeno, preden nastopi nevarnost okužb (aktivnost mušic). Možnost okužbe zmanjšamo tudi z zatiranjem mušic oziroma s preprečevanjem nastanka ugodnih pogojev za množenje in preživetje mušic. Med te ukrepe sodijo izsuševanje, prestavljanje odprtih gnojšč dlje od živali, pa tudi goste mreže na odprtinah hlevov.



V nekaj mesecih se je okuženo območje precej povečalo, predvsem v smeri proti Sloveniji.