

**NAVODILO ZA UPORABO**  
**CheckMite+, 13,6 g trak za v čebelje panje**

**1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA**

Izdelovalec, odgovoren za sprostitvev serije: KVP Pharma und Veterinär GmbH, Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Nemčija

**2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

CheckMite+, 13,6 g trak za v čebelje panje

**3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN**

Kumafos: 100 mg/g

**4. INDIKACIJA**

Zdravljenje varoze in zaščita čebeljih družin pred napadi *Varroa Destructor*.

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Zdravila ne uporabite v obdobju vzgoja matice.

**6. NEŽELENI UČINKI**

Med zdravljenjem čebel zdravilo lahko škoduje vzgoju matic in zaleganju jajčec.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

**7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Čebele

**8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Za vsako čebeljo družino potrebujemo 2 trakova. Obesimo ju med satna okvirja v leglu. Zdravilo ostane v panju 42 dni.

**9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Sočasno zdravimo vse okužene družine ter družine v bližini. Trakove vstavljamo zgodaj spomladi pred začetkom nabiranja nektarja ali jeseni, ko smo nehali točiti med.

**10. KARENCA**

Med: 0 dni

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30°C.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojnini in PVC vrečki. EXP:

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: Uporabite vse trakove po odprju vrečke.

**12. POSEBNA OPOZORILA**

Zdravila ne uporabite v obdobju vzgoja matice.

**Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih**

Samo za uporabo v čebelnjakih.

Trakovi ne smejo ostati v čebelji družini več kot 42 dni.

Trakov ne smemo ponovno uporabiti.

**Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo**

Izogibajte se stiku kože s trakovi. Med rezanjem in vstavljanjem trakov nosite zaščitne rokavice.

Med vstavljanjem trakov ne jejte in pijte. Ne shranjujte v bližini hrane, krme in pitne vode. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Po ravnanju s trakovi si umijte roke.

V primeru nenamerne zastrupitve se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Čimprej injiciramo **antidot 1-% atropinijev sulfat** in sicer v odmerku 0,2 – 0,5 ml im.

Po potrebi dajanje antidota ponovimo, če se zaradi upadanja delovanja atropina poslabšajo znaki zastrupitve (zožanje zenic, tresenje mišic, bruhanje, driska).

**13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJA**

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjstve odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

**14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO**

ŠTEVILKA DOVOLJENJ ZA PROMET:

**15. DRUGE INFORMACIJE**

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Salus, Veletrgovina, d.o.o.

Litostrojska 46A

1000 Ljubljana