

**NAVODILO ZA UPORABO**  
**Formivar 85% ad us.vet., raztopina**

**1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITVEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA**

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec, odgovoren za sprostitvev serije:

Andermatt BioVet AG  
Stahlermatten 6  
CH- 6146 Grossdietwil  
Švica

**2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**  
**Formivar 85% ad us.vet., raztopina**

**3. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SESTAVIN**

**Zdravilna učinkovina:**

100 g Formivar 85% ad us.vet. vsebuje:

85 % mravljično kislino 100g

**Pomožna snov:**

Voda 0g

**4. INDIKACIJE**

Zatiranje in zdravljenje varoze pri medonosih čebelah (*Apis mellifera*).

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Ne uporabljajte v času točenja medu.

**6. NEŽELENI UČINKI**

Lahko pride do poškodbe odprte zalege. V primeru prevelikega odmerjanja lahko pride do izgube zalege ali izgube matice.

**7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Medonosne čebele (*Apis mellifera*)

**8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Namenjeno za dolgotrajno izhlapevanje v delu panja z zalego s pomočjo ustreznega hlapilnika namenjenega za uporabo v Alberti-Žnideršičevih panjih, nakladnih in drugih panjih.

Za pravilno ravnanje upoštevajte navodila za uporabo izbranega hlapilnika.

Tretiranje se izvaja dvakrat na leto (odvisno od stanja v čebelji družini), eno tretiranje se izvede neposredno po točenju medu in drugo po obdobju hranjenja, pred prenehanjem zaleganja (julij/avgust ali september).

Za več informacij glede zdravja medonosnih čebel (zlasti glede odmerjanja in zunanjih temperatur) glejte spletno stran švicarskega centra za raziskave čebel [www.apis.admin.ch](http://www.apis.admin.ch).

**9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Glejte poglavje 8.

**10. KARENCA**

Med: nič dni.

Uporabite po zadnjem točenju medu v letu.

Če tretirate spomladi v času medenja (zdravljenje v nujnih primerih) se med iz morebitne druge čebelje paše ne sme tržiti zaradi možnih zaostankov.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri sobni temperaturi (15-25 °C).

Zaščitite pred svetlobo in shranjujte tesno zaprto.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojni.

**12. POSEBNA OPOZORILA**

Delajte v odprtih ali v dobro prezračenih prostorih.

Raztopina je korozivna (jedka)!

Ne vdihovati hlapov!

Pri delu z mravljično kislino je treba nositi zaščitne rokavice, ki so odporne na kislino in zaščitna očala.

Pokrijte izpostavljeno kožo. Za spiranje imejte pripravljeno zadostno količino vode ali pa delajte poleg tekoče vode. Imejte pripravljen tuš za spiranje oči (ali vodo za spiranje oči). V primeru stika z očmi, si le-te temeljito sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.

V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč.

Neporabljeno zdravilo pred odstranjevanjem razredčite z vodo (najmanj v razmerju 1:10).

Učinkovitost je med drugim odvisna tudi od panjskega sistema (1 naklada, 2 nakladi, Dadant ipd.), vremenskih razmer med tretiranjem in od hlapilnika.

**13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

**14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO**

Marec 2013

**15. DRUGE INFORMACIJE**

Organska kislina z akaricidnim učinkom

**Delovanje**

Mravljična kislina pri varojah zavira dihanje in povzroča acidozo. Varoje so bolj občutljive na mravljično kislino kot čebelje ličinke in odrasle čebele.

**Način izdaje zdravila**

Brez recepta.

**Oprema**

HDPE pakiranje po 1000 ml