



## API-Bioxal

886 mg/g topni prašek za medonosne čebele

**1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA**

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

CHEMICALS LAIF S.P.A.

V.le dell'Artigianato n° 13, 35010

Vigonza (PD), Italija

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

CHEMIFARMA SPA

Via Don Eugenio Servadei n° 16

47100 Forlì (FC), Italija

**2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

API-Bioxal, 886 mg/g topni prašek za medonosne čebele

Oksalna kislina

**3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN**

100 g zdravila vsebuje:

Zdravilna učinkovina:

Oksalna kislina v obliki dihidrata ..... 88,60 g

**4. INDIKACIJE**

Čebele (*Apis mellifera*)

Zdravljenje varooze (*Varroa destructor*, parazit *Apis mellifera*).

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Zdravilo se uporablja le v obdobju brez zalege ali po tem, ko je bila zalega prekinjena. Prisotnost zalege lahko opazno zmanjša učinkovitost API-Bioxal.

**6. NEŽELENI UČINKI**

Družina je lahko med zdravljenjem rahlo vznemirjena.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

**7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Medonosne čebele

**8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Zdravilo je v obliki topnega praška za čebele in se ga uporablja tako:

**A) Odmerjanje in način dajanja pri kapljični metodi:**

Odprite vrečko API-Bioxal in raztopite ves prašek v določeni količini sirupa (voda in saharoza v razmerju 1:1).

- API-Bioxal vrečka 35g: raztopite v 500 ml sirupa.

- API-Bioxal vrečka 175g: raztopite v 2.5 l sirupa.

- API-Bioxal vrečka 350g: raztopite v 5.0 l sirupa.

Zdravljenje je enkratno. Raztopino nanesite z brizgo na satje v odmerku 5 ml na sat poln čebel.

**B) Odmerjanje in način dajanja z izhlapevanjem**

Uporabite električno odporno napravo za izhlapevanje. Hlapilnik napolnite z 2,3 g API-Bioxal. Napravo postavite pred vhod v panj pod čebele tako, da se ne dotika satja. Zatesnite vhod v panj, da preprečite izhod čebelam in plinu. Za vklop hlapilnika sledite navodilom proizvajalca. Zdravilo naj hlapi približno 3 minute (približno 280-290°C končne temperature). Čebele naj bodo zaprte še nadaljnjih 10 minut.

Ohladite in očistite hlapilnik po vsaki uporabi zaradi morebitnih ostankov (max 6%, okoli 0,140 g).

Za hlajenje in/ali čiščenje uporabite pitno vodo.

**Integrirano zatiranje škodljivcev**

Učinkovitost lahko variira med družinami zaradi pogojev uporabe (ostanki, prisotnost zalege, temperatura, reinfestacija itd.). Zdravilo se zato uporablja kot zdravljenje med drugim v Integriranem zatiranju škodljivcev, redno se spremlja odpadanje pršic.

## **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Za najboljšo učinkovitost uporabite zdravilo na zečetku zime, ko je zalega zmanjšana ali je ni in poleti po tem, ko je bila zalega prekinjena. Za doseganje visoke učinkovitosti uporabite zdravilo v družinah, ki so naravno brez zalege ali v družinah, kjer je bila zalega prekinjena. Kljub primernemu zdravljenju se lahko zgodi, da močno prizadete družine ne preživijo infestacije.

## **10. KARENCA**

Med: nič dni

## **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku.

Vrečke zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Prašek shranjujte v originalni ovojnini.

Po odprtju vrečko dobro zaprite, da zdravilo zaščitite pred vlago.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojni.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 3 mesece

## **12. POSEBNA OPOZORILA**

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Zdravite brez mediščnih naklad.

Vse družine v čebelnjaku je treba zdraviti istočasno, da se izognete reinfestacijam.

Izogibajte se motnjam v panjih v dneh po zdravljenju.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Izogibajte se direktnemu stiku zdravila s kožo in očmi zaradi možnega kontaktnega dermatitisa in draženja kože in oči zaradi pH zdravila.

Ko rokujete z zdravilom (v fazi zdravljenja in po zdravljenju) nosite neprepustne rokavice in zaščitna očala. Ko rokujete s praškom (v fazi izhlapevanja in pred zdravljenjem) nosite zaščitno masko tipa FFP2, rokavice in zaščitna očala.

Po aplikaciji si umijte roke z milom in vodo. Material, ki je prišel v stik s trakovi, operite z milom in vodo.

V primeru stika s kožo prizadeto področje takoj operite z milom in vodo.

V primeru stika z očmi, jih takoj izperite z veliko količino čiste tekoče vode in se posvetujte z zdravnikom.

Ne vdihavajte zdravila.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Ne uporabljajte istočasno z drugimi akaricidi.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Prevelik odmerek lahko povzroči težave v poznejšem razvoju družine. Preveliki odmerki ali kontinuirano dajanje lahko v družinah povzročijo znižanje števila odraslih čebel.

Inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne uporabljajte istočasno z drugimi akaricidi.

## **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in druge vodne organizme.

## **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO**

## **15. DRUGE INFORMACIJE**

Velikosti pakiranja: vrečka s 35 g, 175 g ali 350 g praška.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Vetconsult pharma d.o.o.

Gerbičeva 50

1000 Ljubljana