

## NAVODILO ZA UPORABO

### Bayvarol dvojni trak 3,6 mg trak za čebeljo družino

#### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer d.o.o.  
Bravničarjeva 13  
1000 Ljubljana

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

KVP, Pharma –und Veterinär-Produkte DmbH  
Projensdorfet Str, 324, D-24106 Nemčija

#### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bayvarol dvojni trak 3,6 mg trak za čebeljo družino

#### 3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

En trak vsebuje:

##### Zdravilna učinkovina:

flumetrin 3,6 mg

#### 4. INDIKACIJA(E)

Za diagnozo in zdravljenje varoze pri čebelah (na flumetrin občutljive vrste *Varroa destructor*).

#### 5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte zdravila med pašo.

Ne uporabljajte sočasno z drugimi pripravki za zdravljenje varoze.

Ne uporabljajte sočasno s pripravki za zdravljenje noseme.

#### 6. NEŽELENI UČINKI

Ni znano.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

#### 7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Čebele

#### 8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

V normalno razvite družine vstavimo štiri trakove, družinam z zalego in mladim družinam pa polovico tega odmerka, t.j. dva trakova. Velikim družinam v panjih z več nakladami vstavimo štiri trakove v vsako naklado in to v sredo legla.

## Diagnoza

Trakove pustimo v družini 24 ur. Preden vstavimo trakove, na tla položimo kontrolni pladenj z belim papirjem, nanj pa postavimo mrežo. Nato skrbno pregledamo kontrolni pladenj, da bi ugotovili, koliko varoj je odpadlo v 24 urah. Če se število mrtvih varoj ne poveča v prvih dnevih zdravljenja, se priporoča uporaba drugega razreda akaricidov.

## Zdravljenje

Trakove pustimo v družinah največ šest tednov in jih nato odstranimo.

### **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Bayvarol trakove obesimo med satje v osrednjem delu panja na mejno črto med leglom in vencem cvetnega prahu tako, da se lahko čebele prosto gibljejo po obeh straneh. Obe oprijemalki na traku na označenem pregibu zapognemo in pritrdimo na zgornji rob lesenega satnega okvirja. Pri velikih družinah z velikim leglom konca dveh trakov lahko povežemo, kar nam omogoča, da ju vstavimo in odstranimo iz čebeljih prostorov brez ločevanja prostorov za izleganje.

Največji učinek zdravljenja lahko pričakujemo, če Bayvarol vstavimo v poznem poletju po točenju medu. Bayvarol lahko uporabljamo tudi v drugem letnem času za diagnozo ali pri hudih okužbah, če je ogroženo preživetje kolonije.

Odgovorno čebelarstvo v teh dneh zahteva redno preverjanje čebelnjakov redne okužbe z varojo in poseben program letnega nadzora proti varoji.

### **10. KARENCA**

Med: 0 dni

### **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

### **12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)**

Ne uporabljajte zdravila med pašo.

Paraziti lahko razvijejo odpornost na določen razred akaricidov izključno zaradi pogoste rabe le tega.

Vrečke iz folije odprite šele neposredno pred uporabo.

### **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

### **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO**

### **15. DRUGE INFORMACIJE**

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.